

CULTIVO DE HECES para la detección de HUEVOS y PARÁSITOS

Instrucciones para la recolección de heces

El medio de recolección que se encuentra en el frasco es TÓXICO – Mantener alejado de los niños pequeños.

Instrucciones:

1. Para obtener la muestra, le hemos entregado lo siguiente:
 - Recipiente con forma de sombrero para la obtención de la muestra
 - Huevos y parásitos (Kit Para Pak – frasco con tapa rosa y frasco con tapa gris)
 - Medio de cultivo de heces (Fecal Enteric Plus – frasco con tapa verde)
 - Aplicador de madera
 - Hoja de instrucciones
2. **Identifique** los frascos con su **nombre y apellido, fecha de nacimiento y fecha y hora en que obtuvo la muestra.**
3. Levante el asiento del inodoro y coloque el recipiente de recolección con forma de sombrero en el borde (con el lado curvo hacia la parte posterior del inodoro).
4. Baje el asiento del inodoro para mantener el recipiente de recolección en su posición. Evacue en el recipiente. La muestra de heces no debe contener orina ni papel higiénico.
5. Use el aplicador de madera o las cucharas de recolección para verter la muestra dentro de cada frasco (no mezcle las cucharas de recolección de frascos distintos); extraiga heces de áreas que contengan sangre o parezcan viscosas o acuosas. Si las heces son de consistencia dura, tome pequeñas muestras de cada uno de los extremos y del centro.
6. Coloque las muestras dentro de los frascos hasta que el contenido llegue a la **LÍNEA ROJA** que se encuentra en la etiqueta de cada frasco. Una vez que las muestras se encuentren dentro de los frascos, tápelos firmemente y luego agite fuertemente cada frasco para que el contenido se mezcle bien.
7. Lávese bien las manos. Si el líquido de los frascos entra en contacto con la piel o los ojos, enjuáguelos con abundante agua.
8. Una vez finalizada la obtención de las muestras, mantenga los frascos a temperatura ambiente y llévelos al laboratorio dentro de las **72 horas**.