

Instrucciones para la recolección de heces para  
la detección de  
**CLOSTRIDIUM DIFFICILE** mediante la  
técnica de RCP

**Instrucciones:**

1. Para obtener la muestra, le hemos entregado lo siguiente:
  - Recipiente con forma de sombrero para la obtención de la muestra
  - Recipiente para la obtención de muestras con tapa de rosca color naranja
  - Aplicador de madera
  - Hoja de instrucciones
2. **Identifique** el recipiente estéril con tapa de rosca color naranja con su **nombre y apellido, fecha de nacimiento y fecha y hora en que obtuvo la muestra.**
3. Levante el asiento del inodoro y coloque el recipiente de recolección con forma de sombrero en el borde (con el lado curvo hacia la parte posterior del inodoro).
4. Baje el asiento del inodoro para mantener el recipiente de recolección en su posición. Evacue en el recipiente. La muestra de heces no debe contener orina ni papel higiénico.
5. Use el aplicador de madera para transferir una cantidad pequeña de la muestra de heces proveniente de áreas que parezcan contener sangre, que sean viscosas o acuosas al recipiente con tapa de rosca color naranja. Una vez que la muestra se encuentre dentro del recipiente, asegúrese de cerrar firmemente la tapa de rosca para evitar pérdidas.
6. Lávese bien las manos.
7. **Refrigere** la muestra hasta que esté listo para llevarla al laboratorio.
8. Lleve la muestra refrigerada **con hielo** y dentro de una bolsa plástica con cierre **dentro de las 24 horas.**