

Instrucciones de recogida de orina en la parte media de la corriente

1. Su proveedor de atención médica o personal de laboratorio le proporcionará una taza de orina **ESTÉRIL** para recoger la muestra.
2. Una muestra de orina temprana de la primera orina es la muestra preferida.
3. Lávese bien las manos antes de recoger la muestra de orina.
4. Antes de la micción, lave bien la zona 2-3 veces con la toalla suministrada o con agua y jabón. Si usa agua y jabón, enjuague bien el área con agua limpia para eliminar cualquier residuo de jabón.
5. Comience a evacuar en el inodoro. Sin detener la corriente de orina, pase la taza de orina estéril en la corriente de orina para recoger la muestra. Retire el vaso de orina de la corriente de orina y complete la micción.
6. La taza de orina estéril no debe entrar en contacto con piernas, pelo, piel o ropa. Si la muestra de orina está contaminada, puede ser necesario repetir la prueba.
7. Devuelva la muestra de orina a un Centro de Servicio para Pacientes de Sanford oa un laboratorio de Sanford lo antes posible. Si no puede devolver la muestra de orina, se puede refrigerar hasta 12 horas.
8. Verifique que la muestra esté claramente etiquetada con su nombre legal completo, fecha de nacimiento, fecha y hora de la recolección.